


टी. बी. चौ.: YPL-S-BLU

10 of 10

1313012



परीक्षण पुस्तिका अनुसार



परीक्षण प्रस्तिका

गीता

संस्कृत विद्या की विद्यालय

spf100

十一

जब यह लापता का प्रोग्राम प्रसिद्धि के लिए न करना चाहिए तब वह नहीं न सुनें।

Note: A French version of the instructions is printed on the back cover of this booklet.

1. $\log_2 \log_2 \sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7}}}$ का मान, निम्नलिखित में से क्या है ?
- $2 \log_2 7$
 - $1 + 3 \log_2 7$
 - $1 - 3 \log_2 7$
 - $\frac{1}{3}$
2. यदि दोनों अम्बा गुणित ऐसी हों कि उनका गुणनफल 5 है, तो निम्नलिखित में से वो दोनों अम्बों की जड़ें क्या हैं ?
- $x < -10$
 - $-10 < x < 0$
 - $0 < x < 10$
 - $x > 10$
3. निम्नलिखित संख्याएँ दो विभाग करिए।
- $8 + x^2 - \frac{1}{x}$
 - $\sqrt{ax^2 + bx + c} - \left(\frac{d}{x} - \frac{e}{x^2} \right)$
 - $(ax^2 - bx + c)$
 - $\frac{a}{x^2 + bx + c^2}$
 - $\frac{a}{x} - \frac{b}{x+5}$
- उपर्युक्त में से भीदो सरीख वर्गजूट हैं ?
- वर्गजूट 1, 4 और 5
 - वर्गजूट 1, 3, 4 और 5
 - वर्गजूट 2, 4 और 5
 - वर्गजूट 1 और 2
4. यदि दो आयत A और आयत B का ज्ञात है तो
- $A = A^T$
 - $A' = A^{-1}$
 - $A = A^{-1}$
 - $A = A'$
- वही A', A का गुणनफल है :
5. यदि A, B तथा C एक सार्वात्मक समुच्चय के सदस्यहरू हैं तो निम्नलिखित में से वोने का यही है ?
- $(A \cup B) \cap (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - $A \cup (A \cup B) = B \cap A' \cap A$
 - $A' \cup (B \cup C) = (C \cap B) \cap A$
 - $(A \cap B) \cup C = (A \cup B) \cap (B \cup C)$
- वही A', A का गुणनफल है :
6. यदि एक लंबवर्ती वर्ष 2000 के लिए वे अन्तर्वर्ष ज्ञात की जाएँ तो वे वर्षों के विकल्पों में से वोने का यही है ?
- 2000
 - 2001
 - 2002
 - 2003
7. यदि $a = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots$ तो विकल्पों में से वोने का यही है ?
- $\frac{10}{9}$
 - $\frac{9}{20}$
 - $\frac{9}{4}$
 - $\frac{4}{9}$

1. What is the value of $\log_2 \log_2 \sqrt{7\sqrt{7+7}}$, equal to ?
- $3 \log_2 7$
 - $1 - 3 \log_2 7$
 - $1 + 3 \log_2 7$
 - $\frac{7}{8}$
2. If an infinite GP has the first term a and the sum S , then which one of the following is correct ?
- $a < -10$
 - $-10 < a < 0$
 - $0 < a < 10$
 - $a > 10$
3. Consider the following expressions :
- $x + x^2 - \frac{1}{x}$
 - $\sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{d}{x} - \frac{e}{x^2}$
 - $2x^2 - 8x + ab$
 - $\frac{x^2}{x^2 - ax + b^2}$
 - $\frac{1}{x} - \frac{2}{x+3}$
- Which of the above are rational expressions ?
- 1, 4 and 5 only
 - 1, 2, 4 and 5 only
 - 2, 4 and 5 only
 - 1 and 2 only
4. A square matrix A is called orthogonal if
- $A = A^T$
 - $A^T = A^{-1}$
 - $A = A^{TT}$
 - $A = A'$
- where A' is the transpose of A .
5. If A , B and C are subsets of a Universal set, then which one of the following is not correct ?
- $(A \cup B) \cap C = (A \cap B) \cap (A \cup C)$
 - $A \cup (B \cup C) = (B \cap A) \cup A$
 - $A' \cup (B \cup C) = (C \cap B) \cap A'$
 - $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- where A' is the complement of A .
6. Let x be the number of integers lying between 2999 and 3000, which have at least two digits equal. Then x is equal to
- 2487
 - 2481
 - 2482
 - 2483
7. The sum of the series $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots$ is equal to
- $\frac{20}{9}$
 - $\frac{9}{20}$
 - $\frac{9}{4}$
 - $\frac{4}{9}$

कीमे हो यह सूचना पर विचार कीजिए और आगे जाने के लिए (102) उत्तरों के उपर लीजिए।

(10) यदि ना यह सर्वेक्षण किया गया : यह प्रथम अवधि 125 दिनों का विषेष व्योत्तरा पद्धति है, 140 दिनों को व्युत्क्रिय व्योत्तरा पद्धति है और 60 दिनों की व्योत्तरा पद्धति है। तो यह योग्य है, कि यह व्योत्तरा में से दोनों दीवाने व्योत्तरा पद्धति होती है।

8. विकल्प द्वारा दो दीवाने व्योत्तरा मुख्यमान पद्धति होती है :

- (a) 14
- (b) 21
- (c) 28
- (d) 35

9. विकल्प द्वारा दो दीवाने व्योत्तरा के लिए दो दीवाने व्योत्तरा पद्धति होती है :

- (a) 195
- (b) 225
- (c) 254
- (d) 265

10. यदि $0 < \alpha < \beta < 0$, तिता व्युत्क्रिय $x^2 + \alpha x - \beta = 0$ के मूल हैं, तो तिता व्युत्क्रिय $-x^2 + (\alpha + \beta)x + \beta = 0$ के मूल हैं, तो

- (a) विभिन्न मान $= -\frac{1}{4}$
- (b) विभिन्न मान $= -\frac{3}{4}$
- (c) विभिन्न मान $= \frac{1}{4}$
- (d) विभिन्न मान $= \frac{3}{4}$

11. $(2 + 3x)^2$ के विवर उत्तर में यहाँ यह का गुणात्मक विकल्प है :

- (a) 6
- (b) 12
- (c) 108
- (d) 216

12. यह का विवर उत्तर A के लिए, विभिन्नतिक्रिया में से दोनों दीवाने (व्योत्तरों) उपर लिखें हैं :

- (1) $(A^{-2})^{-1} = A$
- (2) $\det(A^{-2}) = \frac{1}{\det A}$

(3) $0 \cdot A^{-2} = 0 \cdot A^{-1}$ वाले दीवाने (व्योत्तर) हैं।

विकल्प द्वारा दो दीवाने व्योत्तर का व्युत्क्रिय व्योत्तर होता है :

- (a) दोनों 1 और 2
- (b) दोनों 2 और 3
- (c) दोनों 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

13. विकल्प | x | y | 0 | के लिए विकल्प | x^2 | $5y^2$ | 0 | के लिए विकल्प में से दोनों दीवाने (व्योत्तर) विभिन्न हैं,

विभिन्नतिक्रिया में से दोनों दीवाने व्युत्क्रिय (व्योत्तर) विभिन्न हैं।

- (a) $y=3$
- (b) $x=y$
- (c) $y=0$
- (d) $x=3y$

Consider the information given below and answer the two (02) items that follow:

A survey was conducted among 300 students. It was found that 125 students like to play cricket, 145 students like to play football and 90 students like to play tennis. 35 students like to play exactly two games out of the three games.

8. How many students like to play all the three games?
- 14
 - 21
 - 35
 - 90
9. How many students like to play exactly only one game?
- 100
 - 120
 - 150
 - 180
10. If α and β ($\neq 0$) are the roots of the quadratic equation $x^2 + mx + p = 0$, then the quadratic expression $-x^2 + nx + p$, where $n \in \mathbb{R}$, has
- = \frac{1}{4}= \frac{p}{4}= \frac{1}{4}= \frac{p}{4}

11. What is the coefficient of the middle term in the binomial expansion of $(2 + 3x)^6$?

- 6
- 12
- 108
- 216

12. For a square matrix A, which of the following properties hold?

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$

3. $(\lambda A)^{-1} = \lambda A^{-1}$ where λ is a scalar

Select the correct answer using the code given below:

- 1 and 2 only
- 2 and 3 only
- 1 and 3 only
- 1, 2 and 3

13. Which one of the following factors does the expansion of the determinant

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 \\ x^2 & 5x^2 & 0 \\ x^3 & 10x^3 & 0 \end{vmatrix}$$
 contain?

- $x - 3$
- $x + y$
- $x - 3y$
- $x + 3y$

14. $\sin\theta = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}$ का सापेक्ष
परिणाम क्या है ?

(a) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} \sin(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

15. $\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{2m} + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^{2m}$ का मान क्या है,
जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है ?

(a) 0

(b) 0

(c) 1

(d) 0

16. यदि किसी विलोमी के बिन्दु से 0 विलोमी वेतनाली का
वर्णन है, तो 11 विलोमीयों की एक दोष ऐसे विलो-
मीयों के लिये जो वर्णनीय है कि उनमें 0 वेतनाली है ?

(a) C(17, 11)

(b) C(12, 8)

(c) C(17, 5) \times U(8, 7)

(d) C(8, 9) \times C(12, 8)

17. $\log_2 27 + \log_2 24$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{7}{2}$

(b) $\frac{19}{6}$

(c) 4

(d) 7

18. यदि A और B दो व्यवस्था विकल्पों का
प्रणाली है, तो $(AB)^{-1}$ विकल्प का रूप है ?

(a) $B^{-1}A^{-1}$

(b) $A^{-1}B^{-1}$

(c) $B^{-1}A$

(d) $A^{-1}B$

14. What is the adjoint of the matrix

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta - 90) & -\sin(\theta - 90) \\ -\sin(\theta - 90) & \cos(\theta - 90) \end{pmatrix}?$$

(a) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$

15. What is the value of

$$\left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}\right)^{2n} + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)^{2n},$$

where $i = \sqrt{-1}$?

(a) 3

(b) 2

(c) 1

(d) 0

16. There are 17 cricket players, out of which 5 players can bowl. In how many ways can a team of 11 players be selected so as to include 3 bowlers ?

(a) $C(17, 11)$

(b) $C(12, 8)$

(c) $C(17, 5) \times C(12, 8)$

(d) $C(5, 3) \times C(12, 8)$

17. What is the value of $\log_2 27 + \log_3 22 \cdot ?$

(a) $\frac{7}{2}$

(b) $\frac{19}{6}$

(c) 4

(d) 7

18. If A and B are two invertible square matrices of same order, then what is $(AB)^{-1}$ equal to ?

(a) $B^{-1}A^{-1}$

(b) $A^{-1}B^{-1}$

(c) $B^{-1}A$

(d) $A^{-1}B$

19. यदि $a + b + c = 0$ हो, तो

$$\begin{vmatrix} a+x & a & b \\ a & b+x & c \\ b & c & c+x \end{vmatrix} = 0$$

का गुणन के समान होता है।

(a) $x = a$

(b) $x = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}$

(c) $x = \sqrt{\frac{2(a^2 + b^2 + c^2)}{3}}$

(d) $x = 0$

20. एक सरल विलोम होमा प्राप्ति कि अवधार $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & x \end{pmatrix}$

का अवधार अवधार होता है।

(a) 16

(b) -16

(c) 8

(d) -8

21. मुख्यमाण विकल्प

$$2x + y - 3z = 6,$$

$$3x - 2y + 2z = 6 \text{ और}$$

$$5x - 3y - z = 16$$

(a) असंतुष्ट है

(b) संतुष्ट है, एक अद्वितीय रूप के राष्ट्र

(c) संतुष्ट है, असंतुष्ट अनेक रूपों के राष्ट्र।

(d) संतुष्ट नहीं असंतुष्ट है, क्योंकि इसका अवधार अवधार है।

22. एक (एक्रिट) के प्रबन्धों के सभी से सम्बन्धित वे दो समान होती हैं।

(a) वे सीधे होते हैं।

(b) वे $\sqrt{2}$ विभाग वाले एक शुद्धार होते हैं।

(c) वे एक समान विभाग वाले हैं।

(d) अवधार वे से प्रोटोकॉल

23. यदि p, q और r (सभी प्राप्तान्तर) एक गुणोंमान गणी (GP) के प्रति, q^2 और r^2 पर है, तो अवधार

$$\begin{cases} \ln p &= 3 \\ \ln q &= 4 \\ \ln r &= 1 \end{cases}$$

(a) सामान्यकार है।

$$(b) 0$$

$$(c) 1$$

$$(d) (p-q)(q-r)(r-p)$$

$$(e) (\ln u \times \ln v) + (\ln w)$$

24. यदि सीरीज $(1+x)^m$ के शुरूआत में यथा पर एक गुणाकार है और $(1+xt)^m - 1$ के शुरूआत में यथा पर एक गुणाकार है तो t सम्बन्धित अवधार में से अधिकार अवधार होती है।

$$(a) m > p > r$$

$$(b) m < p < r$$

$$(c) m = p = r$$

$$(d) m = p$$

19. If $a + b + c = 0$, then one of the solutions of

$$\begin{vmatrix} a+x & b & c \\ c & b-x & a \\ b & a & c-x \end{vmatrix} = 0$$

(a) $x = 0$

(b) $x = \sqrt{\frac{2(a^2 + b^2 + c^2)}{3}}$

(c) $x = \sqrt{\frac{2(a^2 + b^2 + c^2)}{3}}$

(d) $x = 0$

20. What should be the value of a so that the

matrix $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -8 & a \end{pmatrix}$ does not have an inverse?

(a) 16

(b) -16

(c) 8

(d) -8

21. The system of equations

$2x + y - 3z = 0$

$3x - 2y + 4z = 5$ and

$5x - 3y - z = 10$

(a) is inconsistent.

(b) is consistent, with a unique solution.

(c) is consistent, with infinitely many solutions.

(d) has no solution lying along x -axis in three-dimensional space.

22. Which one of the following is correct in respect of the cube roots of unity?

(a) They are collinear.

(b) They lie on a circle of radius $\sqrt{3}$.

(c) They form an equilateral triangle.

(d) None of the above.

23. If a , b and c (all positive) are the p^{th} , q^{th} and r^{th} terms of a GP, then the determinant of the matrix

$$\begin{vmatrix} ab & p & 1 \\ ac & q & 1 \\ bc & r & 1 \end{vmatrix} \text{ is}$$

(a) 0

(b) 1

(c) $(p-q)(q-r)(r-p)$

(d) $\ln a, \ln b, \ln c$

24. Let the coefficient of the middle term of the binomial expansion of $(1 + x)^m$ be α and those of two middle terms of the binomial expansion of $(1 + x)^{m-1}$ be β and γ . Which one of the following relations is correct?

(a) $\alpha > \beta + \gamma$

(b) $\alpha < \beta + \gamma$

(c) $\alpha = \beta + \gamma$

(d) $\alpha = \beta$

25. यदि सेट $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\}$,
 $B = \{y \in \mathbb{R} : -1 \leq y \leq 1\}$ है और $S, A \times B$ का उपसमुच्चय है, तो $S = \{(x, y) : A \times B : x^2 + y^2 = 1\}$ होगा परंतु क्यों ?
- निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सत्ता है ?
- S, A से \mathbb{R} में एक लेखीय सत्ता है।
 - S, A से \mathbb{R} में एक व्युत्कृष्ट सत्ता है।
 - S, A से \mathbb{R} में एक लेखीय जात्यागती जटिलियत है।
 - S का सत्ता नहीं है।
26. यदि श्रृंखला कि $x = 1, 2, 3, \dots$ के बीच y , Real-वासिक श्रृंखला (AP) व्यवस्था चलती है। यदि श्रृंखला को यह अवधारणा करें कि a_n के लिए अपनी दो अपवाहन वृद्धि $T_a = 1/n$ ही, $T_b = 1/m$ है, तो T_{sum} विकल्प के बीच होगा ?
- $(nm)^{-1}$
 - $m^{-1} + n^{-1}$
 - 1
 - 0
27. यदि श्रृंखला कि (a) यह अपना का एक उपाय अवधारणा है कि यह अपी जात्यागती x के लिए व्यापक है।
यदि $f(x) = f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)$ है, तो निम्नों के बीच का अवधारणा x के लिए
- $f(x) < 0$
 - $f(x) > 0$
 - $f(x) = 0$
 - $f(x) \geq 0$
28. यदि सत्ता को दो जात्यागती A, B और C के संबंध में विवरित किया जाता है तो
- $(A \times B \times C)' = A' \times B' \times C'$
 - $(ABC)' = A'BC'$
 - $(ABC)' = CBA'$
- यदि A' , अपवाहन A का अवधारणा है।
अपवाहन A के लिए यह अपवाहन होती है ?
- जात्यागती अवधारणा
 - जात्यागती अवधारणा
 - जात्यागती अवधारणा
 - जात्यागती अवधारणा
29. दो अपवाहनीय संख्याओं $(11011)_2, (10110110)_2$ और $(10011100y)_2$ का योगफल, द्विवाहारी संख्या $(1011011011)_2$ है। यहाँ y का ग्रन्त ज्ञात हो ?
- $x=1, y=1$
 - $x=1, y=0$
 - $x=0, y=1$
 - $x=0, y=0$
30. यदि श्रृंखला कि अपवाहन A का अपवाहन A' होता है, A के बीच यही वृद्धि का अपवाहन अपवाहन है। यदि x और y अपवाहन A का अवधारणा है, तो AB विकल्प का जात्यागती है ?
- 1
 - $1/2$
 - $1/2$
 - $(1/2)^2$

23. Let $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\}$,
 $B = \{y \in \mathbb{R} : -1 \leq y \leq 1\}$ and S be the
subset of $A \times B$, defined by
 $S = \{(x, y) \in A \times B : x^2 + y^2 = 1\}$.
- Which one of the following is correct?
- S is a one-one function from A into B .
 - S is a many-one function from A into B .
 - S is a bijective mapping from A into B .
 - S is not a function.
24. Let T_r be the r^{th} term of an AP for
 $r = 1, 2, 3, \dots, n$ for some distinct positive
integers m and n we have $T_m = 1/n$ and
 $T_n = 1/m$, then what is T_{mn} equal to?
- $(mn)^{-1}$
 - $m^{-1} + n^{-1}$
 - 1
 - 0
25. Suppose $f(x)$ is such a quadratic expression
that it is positive for all real x .
If $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$, then for any
real x ,
- $g(x) < 0$
 - $g(x) > 0$
 - $g(x) = 0$
 - $g(x) \geq 0$
26. Consider the following in respect of matrices
 A, B and C of same order:
- $(A + B + C)' = A' + B' + C'$
 - $(AB)' = A'B$
 - $(ABC)' = C'B'A$
- where A' is the transpose of the matrix A .
- Which of the above are correct?
- 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
 - 1, 2 and 3
27. The sum of the binary numbers $(11011)_2$,
 $(10110110)_2$ and $(10011a0y)_2$ is the binary
number $(101101101)_2$. What are the values of
 a and y ?
- $a = 1, y = 1$
 - $a = 1, y = 0$
 - $a = 0, y = 1$
 - $a = 0, y = 0$
28. Let matrix B be the adjoint of a square matrix
 A , I be the identity matrix of same order as A .
If b_{ii} is the determinant of the matrix A ,
then what is AB equal to?
- I
 - M
 - M^2
 - $1/b_{ii}$

31. यदि $(b-2)^2 = 2$ और $\log_{10} 2 = 0.3010$ है, तो x का समानिकार्य दरमां जैसा होता है ?
- 10.0
 - 0.5
 - 0.4
 - 0.2
32. 0 से 7 तक के प्रिय अंकों के द्वारा 0 अंकों का सभी सुन्दर संखाएँ बनाई जा सकती हैं ?
- 42360
 - 30240
 - 27216
 - 16120
33. अव्याप्ति $\begin{pmatrix} x & y & z+x \\ x & z & z+x \\ y & z & x+y \end{pmatrix}$ का नियमित घटीकरण होता है ?
- $(x-y)(y-z)(z-x)$
 - $(x-y)(y-z)$
 - $(y-z)(x-z)$
 - $(x-z)^2(y+z+i)$
34. यदि A, B और C या इनके बीच के लिए

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 + \sin A & 1 + \sin B & 1 + \sin C \\ \sin A + \sin^2 A & \sin B + \sin^2 B & \sin C + \sin^2 C \end{array} \rightarrow 0$$
हो, तो निम्नलिखित में से जीवन का एक गढ़ होता है ?
- प्रियता ABC अविद्युत है
 - प्रियता ABC अविद्युत नहीं है
 - प्रियता ABC विद्युत है
 - प्रियता जी उड़ानी के लिए भी जी विद्युत विद्युत जी विद्युत है
35. अव्याप्ति चौटा के अन्तर्गत A और B के बीच में नियमितिहास वा विषय विविध :
- $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$
 - $(A-B)(A+B) = 0 \Leftrightarrow A^2 = B^2$
- यदि 1 विषय अव्याप्त हो तो 0 विषय अव्याप्त हो।
- अव्याप्ति जी के विषयों में से कौन सा विषय है ?
- विषय 1
 - विषय 2
 - जी और 2 दोनों
 - नहीं 1, 2 तो 2
36. $\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$ विषय का क्या है ?
- $\cos 2\theta$
 - $\tan 2\theta$
 - $\sin 2\theta$
 - $\cosec 2\theta$

31. If $(0.12)^x = 2$ and $\log_{10} 2 = 0.3010$, then what is the value of x to the nearest tenth?
- 10.0
 - 0.5
 - 0.4
 - 0.2
32. The total number of 5-digit numbers that can be composed of distinct digits from 0 to 9 is
- 45360
 - 30240
 - 37216
 - 15120
33. What is the determinant of the matrix $\begin{pmatrix} x & y & z+x \\ x & z & z+x \\ y & z & z+y \end{pmatrix}$?
- $(x-y)(y-z)(z-x)$
 - $(x-y)(y-z)$
 - $(y-z)(z-x)$
 - $(z-x)^2(x+y+z)$
34. If A, B and C are the angles of a triangle and
- $$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 + \sin A & 1 + \sin B & 1 + \sin C \\ \sin A + \sin^2 A & \sin B + \sin^2 B & \sin C + \sin^2 C \end{vmatrix} = 0,$$
- then which one of the following is correct?
- The triangle ABC is isosceles.
 - The triangle ABC is equilateral.
 - The triangle ABC is acute.
 - No conclusion can be drawn with regard to the nature of the triangle.
35. Consider the following in respect of matrices A and B of same order:
- $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$
 - $(A-I)(I+A) = O \Rightarrow A^2 = I$
- where I is the identity matrix and O is the null matrix.
- Which of the above is/are correct?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
36. What is $\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$ equal to?
- $\cos 2\theta$
 - $\tan 2\theta$
 - $\sin 2\theta$
 - $\csc 2\theta$

37. यदि $\sec(\theta - \alpha) = \sec(\theta + \alpha)$, तब तो किसी भी (θ, α) में है, यदि $\cos(\theta + \alpha) = 1/3$, तो $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ का मान क्या है ?
- 0
 - 1
 - 1
 - $\frac{1}{3}$
38. यदि $A + B + C = 180^\circ$ है, तो $\sin(2A) - \sin(2B) - \sin(2C)$ का मान क्या है ?
- $-4 \sin A \sin B \sin C$
 - $-4 \cos A \sin B \cos C$
 - $-4 \cos A \cos B \sin C$
 - $-4 \sin A \cos B \cos C$
39. एक गुणार फूल दुग्ध में एक लिंगों के दूसरे (भिन्न) उपर है। गुणार से दुग्ध के दूसरे लिंगों का अवधारण कोण 45° है। फूट दुग्ध के ऊपर से गुणार की ऊँचाई 122 m है, तो दुग्ध की ऊँचाई क्या है ?
- $122 \sin 45^\circ \text{ m}$
 - $122 \tan 45^\circ \text{ m}$
 - $122 \cos 45^\circ \text{ m}$
 - $122 \tan 40^\circ \text{ m}$
40. यदि वृत्तीय वृत्त को A है, तो विशेषज्ञीय वृत्तीय त्रिकोण $\tan^2 A - \cot A)^2 = 1$ का समूह बनता है। विशेषज्ञीय में से A का मान क्या है ?
- 300°
 - 315°
 - 300°
 - 345°
41. निम्नों की एक घटाल के लिए जो तत्त्व से लेजो पर एक विशेषज्ञीय के अधिने के उपर विशेषज्ञीय $\frac{\pi}{6}$ और $\frac{\pi}{3}$ है, विशेषज्ञीय की उपर्युक्त तत्त्व है ?
- $2h$
 - $\frac{3h}{2}$
 - h
 - $\frac{h}{2}$
42. विशेषज्ञीय वृत्तीय वृत्त $x + \cot x = \sqrt{3}$ का अवधारण कोण है, जब $0 < x < 2\pi$ है ?
- $\tan^{-1} \frac{\delta x}{2}$
 - $\tan^{-1} \frac{\pi}{2}$
 - $\tan^{-1} \pi$
 - $\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\delta x}{2}$

37. If $\sec(\theta - \alpha)$, $\sec \theta$ and $\sec(\theta + \alpha)$ are in AP, where $\cos \alpha < 0$, then what is the value of $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$?
- 0
 - 1
 - 1
 - $\frac{1}{2}$
38. If $A + B + C = 180^\circ$, then what is $\sin 2A - \sin 2B - \sin 2C$ equal to?
- $-4 \sin A \sin B \sin C$
 - $-4 \cos A \sin B \cos C$
 - $-6 \cos A \cos B \sin C$
 - $-6 \sin A \cos B \cos C$
39. A balloon is directly above one end of a bridge. The angle of depression of the other end of the bridge from the balloon is 45° . If the height of the balloon above the bridge is 122 m, then what is the length of the bridge?
- $122 \sin 45^\circ \text{ m}$
 - $122 \tan 45^\circ \text{ m}$
 - $122 \cos 45^\circ \text{ m}$
 - $122 \tan 40^\circ \text{ m}$
40. A is an angle in the fourth quadrant. It satisfies the trigonometric equation $\sin^2 A - \tan^2 A - \cot A^2 = 1$. Which one of the following is a value of A?
- 300°
 - 315°
 - 330°
 - 345°
41. The top of a hill observed from the top and bottom of a building of height h is at angles of elevation $\frac{\pi}{6}$ and $\frac{\pi}{3}$ respectively. What is the height of the hill?
- 2h
 - $\frac{3h}{2}$
 - h
 - $\frac{h}{2}$
42. What is/are the solution(s) of the trigonometric equation $\csc x + \cot x = \sqrt{3}$, where $0 < x < 2\pi$?
- $\frac{5\pi}{3}$ only
 - $\frac{\pi}{3}$ only
 - π only
 - $\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}$

42. यदि $0 = \frac{\pi}{6}$ तो

$$(2 \cos \theta + 1)^{10} (2 \cos 2\theta - 1)^{10} (2 \cos 3\theta - 1)^{10} \\ = (2 \cos \theta - 1)^{10}$$

यदि इसका मूल रूप है

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

43. यदि $\cos \alpha = 2\sin \cos \beta$ ($0 < \alpha < \beta < \pi$), तो सबसे छोटी पूर्णांक वृद्धि $x^2 - 3 = 0$ के यहाँ भूल, तो उनमें से जो $\cos \beta$ का मूल रूप है?

- (a) $-\frac{4}{3}$
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $-\frac{3}{4}$

44. x के निम्नलिखित मानों में से किसका कीमित:

- 1. 8
- 2. -4
- 3. $\frac{1}{6}$
- 4. $-\frac{1}{4}$

x के उपर्युक्त मानों में से कौन साथे सहीकरण $\tan^{-1}(2x) + \tan^{-1}(3x) + \frac{\pi}{2}$ का कथन होता है?

- (a) निम्नलिखित
- (b) निम्नलिखित और 3
- (c) निम्नलिखित और 4
- (d) निम्नलिखित 4

45. यदि एक गुणने के लिए (G) का द्वारा द्वारा बढ़ावा दिया जाता है तो उसका असर वह अवश्यक है कि गुणने के लिए (GP) हो।

- (a) $8, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \dots$
- (b) $10, 2, \frac{2}{5}, \frac{2}{25}, \dots$
- (c) $-4, -2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots$
- (d) $-6, 3, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, \dots$

46. यदि a, b, c ऐसी तीनी वाक्यांश त्रियों का गुणनफल हों तो यह तीनों का $\frac{a-b}{b-a}$ गुणनफल होना चाहिए।

- (a) $\frac{b}{a}$ गुणनफल गुणनफल
- (b) $\frac{a}{b}$ गुणनफल $\frac{c}{b}$ गुणनफल
- (c) $1 \operatorname{गुणन} \frac{a}{b} \operatorname{गुणन} \frac{a}{c}$
- (d) $1 \operatorname{गुणन} \frac{a}{b} \operatorname{गुणन} \frac{b}{c}$

47. नीचे दिए गए तीनी वाक्यांशों का गुणनफल ज्ञात हो। यह सभी तीन असी 3, 4 और 5 से बनाए गए तीन हैं। यहाँ असी की कुलसंख्या वाक्यांशों कही जाएगी।

- (a) 2864
- (b) 3883
- (c) 4044
- (d) 4444

43. If $\theta = \frac{\pi}{8}$, then what is the value of

$$\frac{(2 \cos \theta + 1)^{10} (2 \cos 2\theta - 1)^{10} (2 \cos 6\theta - 1)^{10}}{(2 \cos 4\theta - 1)^{10}} ?$$
- (a) 0
 (b) 1
 (c) 2
 (d) 4
44. If $\cos \alpha$ and $\cos \beta$ ($0 < \alpha < \beta < \pi$) are the roots of the quadratic equation $4x^2 - 3 = 0$, then what is the value of $\sec \alpha + \sec \beta$?
- (a) $-\frac{4}{3}$
 (b) $\frac{4}{3}$
 (c) $\frac{3}{4}$
 (d) $-\frac{3}{4}$
45. Consider the following values of x :
- (1) 0
 (2) -4
 (3) $\frac{1}{2}$
 (4) $-\frac{1}{4}$
- Which of the above values of x is/are the solution(s) of the equation

$$\tan^{-1}(2x) + \tan^{-1}(3x) = \frac{\pi}{4} ?$$
- (a) 2 only
 (b) 2 and 3 only
 (c) 1 and 4 only
 (d) 4 only
46. If the second term of a GP is 2 and the sum of its infinite terms is 8, then the GP is:
- (a) 8, 2, $\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \dots$
 (b) 10, 2, $\frac{2}{5}, \frac{2}{25}, \dots$
 (c) 4, 2, 1, $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$
 (d) 6, 3, $\frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \dots$
47. If a, b, c are in AP or GP or HP, then $\frac{b-a}{b+c}$ is equal to
- (a) $\frac{b}{a}$ or 3 or $\frac{a}{c}$
 (b) $\frac{c}{a}$ or $\frac{c}{b}$ or 1
 (c) 1 or $\frac{b}{a}$ or $\frac{a}{b}$
 (d) 1 or $\frac{a}{b}$ or $\frac{b}{a}$
48. What is the sum of all three-digit numbers that can be formed using all the digits 2, 4 and 8, when repetition of digits is not allowed?
- (a) 2264
 (b) 33982
 (c) 4044
 (d) 4444

49. दो वृत्तों की $ax^2 + bx + c = 0$ और $px^2 + qx + r = 0$ की सुनी जा सकती है। यदि D_1 और D_2 इनके द्वारा बनाए गए विभाजन हैं, तो $\frac{D_1}{D_2}$ का मान क्या हो सकता है?

- (a) $\frac{a^2}{p^2}$
 (b) $\frac{b^2}{q^2}$
 (c) $\frac{c^2}{r^2}$

50. असूक्ष्म दो चोटी वाली

51. यदि $A = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$, तो इसके अवलोकन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

- (a) $1 < A < 2$
 (b) $\frac{3}{4} < A \leq 1$
 (c) $\frac{13}{16} < A \leq 1$
 (d) $\frac{3}{4} \leq A \leq \frac{13}{16}$

52. निम्न दो चोटी वाली (अम.) विश्व (x_1, y_1) और (x_2, y_2) को द्वारा दूरी का विवरण है।

- (a) $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = x_1^2 + y_1^2$
 (b) $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = x_2^2 + y_2^2$
 (c) $x^2 + y^2 + 2x_1x_2 + 2y_1y_2 = 0$
 (d) $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

53. दिए गए वृत्त का $x^2 + 4y^2 - 2x - 4y + 5 = 0$ है। इसकी जगह है?

- (a) एक विन्दु
 (b) अपरिवर्तनीय उम्र का विन्दु
 (c) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ दूरी तक वाला एक विन्दु
 (d) असूक्ष्म से जैसे चोटी वाली

54. यदि वृत्त की $I_1x + I_2y + I_3 = 0$ है तो

$I_1x + I_2y + I_3 = 0$ को विन्दु वाली विकासी विवरण में से कौन सा एक सही है?

$$(a) \left| \frac{I_1m' + I_2n'}{|I'| - mn'} \right|$$

$$(b) \left| \frac{I_1m' + I_2n'}{|I'| + mn'} \right|$$

$$(c) \left| \frac{I_1m' - I_2n'}{|I'| - mn'} \right|$$

$$(d) \left| \frac{I_1m' - I_2n'}{|I'| + mn'} \right|$$

49. The ratio of roots of the equations $ax^2 + bx + c = 0$ and $px^2 + qx + r = 0$ are equal. If D_1 and D_2 are respective discriminants, then what is $\frac{D_1}{D_2}$ equal to?

- (a) $\frac{a^2}{p^2}$
- (b) $\frac{b^2}{q^2}$
- (c) $\frac{c^2}{r^2}$
- (d) None of the above.

50. If $A = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$, then for all real θ , which one of the following is correct?

- (a) $1 \leq A \leq 2$
- (b) $\frac{3}{4} \leq A \leq 1$
- (c) $\frac{13}{16} \leq A \leq 1$
- (d) $\frac{3}{4} \leq A \leq \frac{13}{16}$

51. The equation of a circle whose end points of a diameter are (x_1, y_1) and (x_2, y_2) is

- (a) $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = x^2 + y^2$
- (b) $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = x_2 y_1$
- (c) $x^2 + y^2 + 2x_1 x_2 + 2y_1 y_2 = 0$
- (d) $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

52. The second degree equation

$x^2 + 4y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$ represents

- (a) A point
- (b) An ellipse of major axis 1
- (c) An ellipse with eccentricity $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (d) None of the above.

53. The angle between the two lines $ax + by + c = 0$ and $bx + ay + c' = 0$ is given by $\tan^{-1} \theta$. What is θ equal to?

- (a) $\frac{|bm' - fm|}{|B' - am'|}$
- (b) $\frac{|bm' + fm|}{|B' + am'|}$
- (c) $\frac{|bm' - fm|}{|B' + am'|}$
- (d) $\frac{|bm' + fm|}{|B' - am'|}$

54. निम्नलिखित के बीच सम्बन्ध है-

(i) रेखाएँ $y = mx + c_1$ और $y = nx + c_2$ दो
संसापकीय हैं। $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{1+m^2}}$ का मान

(ii) रेखाएँ $ax + by + c_1 = 0$ और
 $dx + ey + c_2 = 0$ दो संसापकीय हैं।
 $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ का मान

(iii) रेखाएँ $x = x_1$ और $x = x_2$ दो संसापकीय हैं।
 $|x_1 - x_2|$ का मान

उपर्युक्त तथ्यों में से कौन से सही है ?

(a) (i) और (ii)

(b) (i) और (iii)

(c) (ii) और (iii)

(d) (i), (ii) और (iii)

55. यदि समान तथा समीकरण रेखा हों जो रेखाएँ
 $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} = 1$ और $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} = 1$ के प्रत्येक दिल्ली के अन्तर्गत रेखा हैं तो उनका समान्तर है और $4x + 6y - 6 = 0$ के रूप में है।

(a) $20x + 30y - 54 = 0$

(b) $25x + 30y - 54 = 0$

(c) $4x + 6y - 34 = 0$

(d) $4x + 6y - 45 = 0$

56. निम्न दो रेखाएँ $2x + 3y + 12 = 0$ व $2x + 4y + 10 = 0$ को छोड़ती हैं।

(a) 1 घूमाएँ (सामान्य)

(b) 2 घूमाएँ (सामान्य)

(c) 2 घूमाएँ (सामान्य)

(d) 4 घूमाएँ (सामान्य)

57. निम्नलिखित O, P, Q और R के निम्नलिखित दिल्ली के अन्तर्गत रेखाएँ OQ , OP , PQ और QR का सामान्य प्रबल के रूप में दिल्ली के अन्तर्गत रेखाएँ हैं। यदि L, M, N और K भास्तु युग्माएँ OQ , OP , PQ और QR का सामान्य प्रबल के रूप में दिल्ली के अन्तर्गत रेखाएँ हैं तो उनका समान्य युग्माएँ LK और LM हैं। इनमें से प्रत्येक की सम्बन्धीय रूप का रूप ज्ञात करें।

(a) (i), (ii)

(b) (i), (ii), (iii)

(c) (i), (ii), (iv)

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

58. यदि $\frac{x-1}{2} + \frac{y-2}{3} = \frac{x-1}{4}$ निम्नलिखित कोणों

(a) $x + y + 2 = 0$ व $x + 2y - 2x = -4$

(b) $x + 2y - 2x = -1$, $4x + 4y - 16x - 32 = 0$

(c) $3x + 2y - 3x = 0$, $3x - 6y + 3x = -2$

(d) $3x + 2y - 3x = -2$, $2x - 6y + 3x = 0$

54. Consider the following statements:

1. The distance between the lines $y = mx + c_1$ and $y = mx + c_2$ is $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{1+m^2}}$.

2. The distance between the lines

$$ax + by + c_1 = 0 \text{ and } ax + by + c_2 = 0 \text{ is } \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

3. The distance between the lines $x = x_1$ and $x = x_2$ is $|x_1 - x_2|$.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

55. What is the equation of straight line passing through the point of intersection of the lines $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ and $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$, and parallel to the line $4x + 5y - 6 = 0$?

- (a) $20x + 25y - 54 = 0$
- (b) $25x + 20y - 54 = 0$
- (c) $4x + 5y - 54 = 0$
- (d) $4x + 5y - 45 = 0$

56. What is the distance of the point $(2, 3, 4)$ from the plane $3x - 4y + 2z + 11 = 0$?

- (a) 1 unit
- (b) 2 units
- (c) 3 units
- (d) 4 units

57. Coordinates of the points O, P, Q and R are respectively $(0, 0, 0)$, $(4, 0, 2m)$, $(2, 0, 2n)$ and $(2, 4, 6)$. Let L, M, N and K be points on the sides OP, OQ, PQ and QR respectively such that LMNK is a parallelogram whose two adjacent sides LK and LM are each of length $\sqrt{2}$. What are the values of m and n respectively?

- (a) 0, 2
- (b) 1, 3
- (c) 2, 1
- (d) None of the above

58. The line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ is given by

- (a) $x+y+z=0$, $x+2y-3z=-4$
- (b) $x+2y-2z=-1$, $4x+4y-5z=0$
- (c) $2x+2y-3z=0$, $2x+6y+2z=-2$
- (d) $3x+2y-3z=-2$, $3x+6y+3z=0$

50. निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें।

- (i) अमरणी २x - y + z = 1 और x + y + 2z = 3
के लिए साध्यता $\frac{1}{2}$ है।

- (ii) अमरणी ०x - ०y + ०z + २ = ० और
 $2x - y + 2z + 3 = 0$ के लिए साध्यता $\frac{10}{9}$ है।

उपर्युक्त वाक्यों में से कौन-कौन सही है?

- (a) केवल (i)
- (b) केवल (ii)
- (c) (i) और (ii) सही
- (d) नहीं (i) व भी (ii)

51. निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें।

- वाक्य I : यदि बिन्दुओं P (m, n) और Q (r, s) के बीच की दूरी विशेष रूप से निम्न तरीके से दिया जाए तो उनकी दूरी है, तो

$$PQ = \sqrt{\frac{(m-r)^2 + (n-s)^2}{(m^2 + n^2)(r^2 + s^2)}}.$$

- वाक्य II : यदि भी त्रिभुज ABC में, तो यह है कि
 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$

उपर्युक्त दो वाक्यों के अध्ययन में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही सही है?

- (a) दोनों वाक्य (i) व (ii) सही हैं और वाक्य (iii), वाक्य (iv) भी सही समर्थनगत हैं।
- (b) दोनों वाक्य (i) व (ii) सही हैं, वाक्य (iii) वाक्य (iv) भी सही समर्थनगत नहीं हैं।
- (c) वाक्य (i) सही है, विन्यु वाक्य (ii) गलत है।
- (d) वाक्य (i) गलत है, विन्यु वाक्य (ii) सही है।

61. यदि एक त्रिभुज का हो लिये गए तीनों

$$\left(x_1, \frac{1}{x_1}\right), \left(x_2, \frac{1}{x_2}\right), \left(x_3, \frac{1}{x_3}\right) \text{ हों।}$$

$$(i) (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)$$

(ii) ०

$$(iii) \left| \frac{(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)}{x_1 x_2 x_3} \right|$$

$$(iv) \left| \frac{(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)}{2x_1 x_2 x_3} \right|$$

62. यदि y -अक्ष, एवं $x^2 + y^2 + px + qy + \frac{r}{4} = 0$ को सभी बराबर है, तो इस विन्दु पर अभिलम्ब, जो यही विन्दु पर बराबर है?

- (a) $\left(-\frac{q}{2}, -\frac{r}{2}\right)$
- (b) $\left(-q, -\frac{r}{2}\right)$
- (c) $\left(-\frac{q}{2}, q\right)$
- (d) $(-q, -r)$

63. यदि दो विकें जो $|a| > 0, |b| > 0$ हैं।

$(a^2 + b^2)(a^2 + b^2) = |a|^2 + |b|^2$ की तोता है, यदि जोड़े जेवल यहि

- (a) a और b एवं
- (b) a और b समता है
- (c) a और b 45° के बीच समता है
- (d) a और b असमान हैं।

60. Consider the following statements :-
- The angle between the planes $2x - y + z = 1$ and $x + y + 2z = 0$ is $\frac{\pi}{3}$.
 - The distance between the planes $4x - 3y + 8z + 2 = 0$ and $2x - y + 2z + 3 = 0$ is $\frac{10}{\sqrt{6}}$.
- Which of the above statements is/are correct?
- 1 only.
 - 2 only.
 - Both 1 and 2.
 - Neither 1 nor 2.
61. Consider the following statements :-
- Statement I** : If the line segment joining the points $P(m, n)$ and $Q(r, s)$ subtends an angle θ at the origin, then
- $$\cos \theta = \frac{mr - ns}{\sqrt{m^2 + n^2}(r^2 + s^2)}$$
- Statement II** : In any triangle ABC, it is true that $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
- Which one of the following is correct in respect of the above two statements?
- Both Statement I and Statement II are true and Statement II is the correct explanation of Statement I.
 - Both Statement I and Statement II are true, but Statement II is not the correct explanation of Statement I.
 - Statement I is true, but Statement II is false.
 - Statement I is false, but Statement II is true.
62. What is the area of the triangle with vertices $\left(x_1, \frac{1}{x_1}\right), \left(x_2, \frac{1}{x_2}\right), \left(x_3, \frac{1}{x_3}\right)$?
- $|x_1 - x_2|(x_1 - x_3)(x_2 - x_1)|$
 - 0.
 - $\frac{|x_1 - x_2|(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)|}{x_1 x_2 x_3}$
 - $\frac{|x_1 - x_2|(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)|}{2x_1 x_2 x_3}$
63. If y -axis touches the circle $x^2 + y^2 + 4x + 4y + \frac{c}{4} = 0$, then the point of contact intersects the circle at the point
- $\left(-\frac{4}{2}, -\frac{c}{2}\right)$
 - $\left(-\frac{4}{2}, -\frac{c}{2}\right)$
 - $\left(-\frac{4}{2}, c\right)$
 - $(-4, -c)$
64. Let $|\vec{a}^2| \neq 0, |\vec{b}^2| \neq 0$.
 $(\vec{a}^2 + \vec{b}^2), (\vec{a}^2 - \vec{b}^2) = |\vec{a}^2|^2 + |\vec{b}^2|^2$ holds if and only if
- \vec{a}^2 and \vec{b}^2 are perpendicular
 - \vec{a}^2 and \vec{b}^2 are parallel
 - \vec{a}^2 and \vec{b}^2 are inclined at an angle of 45°
 - \vec{a}^2 and \vec{b}^2 are anti-parallel

64. यदि $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ है, तो $\vec{r}, (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ के समान दिशा हैं।

- (a) x
- (b) $x+y$
- (c) $-x-y+z$
- (d) $(x+y+z)$

65. यदि $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ वेर्गीय तथा $4\hat{j} - \hat{k}$, तो उनका एक सामान्य गुणनकारी है।

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{k}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{k}$
- (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{k}$
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{k}$

66. यदि $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 4$ तथा $|\vec{a} - \vec{b}| = 5$, तो $|\vec{a} + \vec{b}|$ का मान क्या है?

- (a) 3
- (b) 5
- (c) $5\sqrt{2}$
- (d) 0

67. यदि चौथिये अ. और \vec{c} दोनों वर्गीय तथा अविभाज्य हैं तो यदि $\vec{A} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{B} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ और $\vec{C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$, तो निम्नलिखित में से कौनसा वाक्य सत्य है?

- (a) $|\vec{A}| > |\vec{B}| > |\vec{C}|$
- (b) $|\vec{A}| = |\vec{B}| = |\vec{C}|$
- (c) $|\vec{A}| = |\vec{B}| + |\vec{C}|$
- (d) $|\vec{A}| \neq |\vec{B}| \neq |\vec{C}|$

68. $(\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b})$ किसके बराबर है?

- (a) $\vec{0}$
- (b) $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$
- (c) $2(\vec{a} \times \vec{b})$
- (d) $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$

69. $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ एक स्थापित एक आवधिका पर एक विशेष वक्तव्य के लिए एक अविभाज्य है। अविभाज्य के आपूर्णी का भवित्व है।

- (a) 1
- (b) $\sqrt{3}\lambda$
- (c) $\sqrt{13}\lambda$
- (d) अनुप्रूप वेर्गीय वक्तव्य

66. If $\vec{r} = \vec{a}\hat{i} + \vec{b}\hat{j} + \vec{c}\hat{k}$, then what is $\vec{r} \cdot (\vec{r} + \vec{a}) + \vec{b} \cdot \vec{c}$ equal to?
- \vec{a}
 - $\vec{a} + \vec{b}$
 - $-(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$
 - $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$
67. Let \vec{a} , \vec{b} and \vec{c} be three mutually perpendicular vectors each of unit magnitude. If $\vec{A} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{B} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ and $\vec{C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$, then which one of the following is correct?
- $|\vec{A}| > |\vec{B}| > |\vec{C}|$
 - $|\vec{A}| = |\vec{B}| = |\vec{C}|$
 - $|\vec{A}| = |\vec{B}| = |\vec{C}|$
 - $|\vec{A}| \neq |\vec{B}| \neq |\vec{C}|$
68. A unit vector perpendicular to both of the vectors $\vec{a} = \vec{i} + \vec{k}$ and $\vec{b} = 4\vec{i} + \vec{k}$ is:
- $\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{k}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{k}$
 - $\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\vec{k}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\vec{k}$
69. What is $(\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b})$ equal to?
- $\vec{0}$
 - $\vec{a} \times \vec{b}$
 - $2(\vec{a} \times \vec{b})$
 - $|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$
70. An aircraft located at $\vec{r} = 2\vec{i} + 3\vec{k}$ is subjected to a force $3\vec{k}$ by firing a rocket. The aircraft is subjected to a moment of magnitude
- 3
 - $\sqrt{3}$
 - $\sqrt{5}$
 - None of the above

70. यदि त्रिकोण ABC का शीर्ष C में लिखा जाए, तो समस्तिका वक्तव्य का निम्न फॉर्म है:

- $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$
- $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{CA} = \vec{0}$
- $\vec{AB} - \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$
- $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$

प्रश्नानुसार वक्तव्य का विकल्प कौन है?

- एक
- दो
- तीन
- चार

71. यदि अधिकारी की जगह $y = \sin^{-1}(\tan x)$ की गणना $\tan 0 < 0$ के बाहरी अवस्था ($0, \pi$) पर 0 का वर्णन है:

- $\frac{\pi}{2}$
- $\frac{3\pi}{4}$
- $\frac{\pi}{4}$
- $\frac{\pi}{3}$

72. यदि $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}$, तो इसका ग्राफ को निम्नलिखित बहुपद P_4 की वक्तव्य को संतुष्ट करता है, तो इसका विकल्प कौन है?

- $(-\infty, 4) \cup (4, \infty)$
- $[4, \infty)$
- $(1, 4) \cup (4, \infty)$
- $(1, 4) \cup (4, \infty)$

73. फलन

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{6x} & \text{जब } x \neq 0 \\ \frac{2}{15} & \text{जब } x = 0 \end{cases}$$

फलन का ग्राफ में, समस्तिका में से कौनसा एक वर्ग है?

- जब $x = 0$ पर संतुष्ट नहीं है
- जब $x = \pi$ पर संतुष्ट नहीं है
- जब $x = \pi/2$ पर संतुष्ट नहीं है
- जब $x = 0$ पर संतुष्ट है

74. फलन $f(x) = |x - 3|$ के लिए, समस्तिका में कौनसा एक वर्ग है?

- जब $x = -3$ पर संतुष्ट नहीं है
- फलन $x = 3$ पर संतुष्ट है
- फलन $x = 0$ पर संतुष्ट नहीं है
- फलन $x = -3$ पर संतुष्ट नहीं है

75. यदि फलन $f(x) = \frac{2x - \sin^{-1} x}{2x + \tan^{-1} x}$ अपने ग्राफ के अधिक विद्युत वर्ग है, तो यह कौन सा है?

- $-\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{3}{2}$
- 2

70. In a triangle ABC, if taken in order, consider the following statements:

1. $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$
2. $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{CA} = \vec{0}$
3. $\vec{AB} - \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$
4. $\vec{BA} - \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$

How many of the above statements are correct?

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) Four

71. Let the slope of the curve $y = \tan^{-1}(\sin x)$ be $\tan \theta$. Then the value of θ in the interval $(0, \pi)$ is

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{\pi}{3}$

72. If $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}$ defines a function on \mathbb{R} , then what is its domain?

- (a) $(-\infty, 4) \cup (4, \infty)$
- (b) $[4, \infty)$
- (c) $(1, 4) \cup (4, \infty)$
- (d) $[1, 4) \cup (4, \infty)$

73. Consider the function:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{2x} & \text{if } x \neq 0 \\ \frac{2}{15} & \text{if } x = 0 \end{cases}$$

Which one of the following is correct in respect of the function?

- (a) It is not continuous at $x=0$
- (b) It is continuous at every x
- (c) It is not continuous at $x=\pi$
- (d) It is continuous at $x=0$

74. For the function $f(x) = |x-3|$, which one of the following is not correct?

- (a) The function is not continuous at $x=-3$
- (b) The function is continuous at $x=3$
- (c) The function is differentiable at $x=0$
- (d) The function is differentiable at $x=-3$

75. If the function $f(x) = \frac{2x - \sin^{-1} x}{2x + \tan^{-1} x}$ is continuous at each point in its domain, then what is the value of $f(0)$?

- (a) $-\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{1}{3}$
- (c) $\frac{2}{3}$
- (d) 2

78. यदि $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ है, तो $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ का मान क्या है?

- (a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (c) $-\frac{1}{4\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

79. यदि $y = \tan^{-1} \left(\frac{5 - 2 \tan \sqrt{x}}{2 + 5 \tan \sqrt{x}} \right)$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ का मान क्या है?

- (a) $-\frac{1}{2\sqrt{x}}$
- (b) 1
- (c) -1
- (d) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

80. यदि $f(x) = x \sin x + \cos x + \frac{1}{2} \cos^2 x$ है, तो इसकी अवकलनीयता का अधिकारी क्या है?

- (a) अप्रतिकृत $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में अवकलनीय
- (b) अप्रतिकृत $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में अवकलनीय
- (c) अप्रतिकृत $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ में अवकलनीय
- (d) अप्रतिकृत $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ में अवकलनीय

81. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos \theta}}{\theta}$ का मान क्या है?

- (a) $\sqrt{2}$
- (b) $\sqrt[3]{2}$
- (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (d) $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$

82. यदि फलन $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, जहाँ पर $f(x) = x^2 - 4x + 5$ है, तो फलन f के लिए $A = (3, 4)$ के उपरी भूमि पर का मान (C.R.) क्या है?

- (a) (2, 6)
- (b) (3, 5)
- (c) (1, 5)
- (d) (1, 3)

83. $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c |x| dx$ का मान क्या है, यदि f एक विपरीत फलन है?

- (a) $b - a$
- (b) $a - b$
- (c) 0
- (d) $2(b - a)$

76. If $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$, then what is $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ equal to?
- $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 - $-\frac{3}{4\sqrt{2}}$
 - $\frac{1}{4\sqrt{2}}$
77. If $y = \tan^{-1} \left(\frac{3 - 2 \tan \sqrt{x}}{3 + 5 \tan \sqrt{x}} \right)$, then what is $\frac{dy}{dx}$ equal to?
- $-\frac{1}{2\sqrt{x}}$
 - 1
 - -3
 - $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
78. Which one of the following is correct in respect of the function
 $f(x) = x \sin x + \cos x + \frac{1}{2} \cos^2 x + 1$
- It is increasing in the interval $(0, \frac{\pi}{2})$
 - It remains constant in the interval $(0, \frac{\pi}{2})$
 - It is decreasing in the interval $(0, \frac{\pi}{2})$
 - It is decreasing in the interval $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$
79. What is $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - \cos n}}{n}$ equal to?
- $\sqrt{2}$
 - $2\sqrt{2}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 - $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$
80. A function $f: A \rightarrow B$ is defined by the equation $f(x) = x^2 - 4x + 5$ where $A = (1, 4)$. What is the range of the function?
- $(2, 6)$
 - $(1, 5)$
 - $[1, 5]$
 - $[1, 6]$
81. What is $\int_a^b |x| dx + \int_b^a |-x| dx$ equal to, where $\lfloor x \rfloor$ is the greatest integer function?
- $b-a$
 - $a-b$
 - 0
 - $2(b-a)$

82. $\int_{-\pi}^{\pi} |x - \pi| dx$ फलात्मक है।

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

83. $\int \sin^2 x \cos x dx$ फलात्मक है।

- (a) $\sin^3 x + c$
- (b) $\sin^4 x + c$
- (c) $\frac{(1 - \sin^2 x)^2}{4} + c$
- (d) $\frac{(1 - \cos^2 x)^2}{4} + c$

असेही विकल्पोंमें से कौनसा है ?

84. $\int e^{f(x)} dx$ फलात्मक है।

- (a) $f(x) \tan x + c$
- (b) $f(x) \sec x + c$
- (c) $\tan x + c$
- (d) $\sec x + c$

असेही विकल्पोंमें से कौनसा है ?

85. $\int_{-1}^1 \left\{ \frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \frac{1}{x} \right) \right\} dx$ फलात्मक है।

- (a) 0
- (b) $-\frac{\pi}{4}$
- (c) $-\frac{\pi}{2}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

86. निम्नलिखित अवकल समीकरण में y विलयन, अवकलनका फलात्मक है।

- (a) $(-\infty, 2)$
- (b) $(1, \infty)$
- (c) $(-\infty, 1)$
- (d) $(2, \infty)$

87. यदि फलात्मक $y = p \sin(\alpha x) + q \cos(\alpha x)$, तब p, q के बीच का असेही सम्बन्ध है।

- (a) $\frac{dy^2}{dx^2} + \alpha^2 y = 0$
- (b) $\frac{dy^2}{dx^2} - \alpha^2 y = 0$
- (c) $\frac{dy^2}{dx^2} + \alpha y = 0$
- (d) $\frac{dy^2}{dx^2} - \alpha^2 y = 0$

82. What is $\int_{-1}^1 |x-3| dx$ equal to?

- (a) -2
- (b) 0
- (c) 4
- (d) 8

83. What is $\int \sin^2 x \cos x dx$ equal to?

- (a) $\sin^3 x + C$
- (b) $\sin^3 x + c$
- (c) $\frac{(1-\cos^2 x)^2}{4} + C$
- (d) $\frac{(1-\cos^2 x)^2}{4} + c$

where c is the constant of integration.

84. What is $\int_0^{\pi} e^{(\tan x)} dx$ equal to?

- (a) $\ln |\tan x| + C$
- (b) $\ln |\sec x| + C$
- (c) $\tan x + C$
- (d) $e^{\tan x} + C$

where c is the constant of integration.

85. What is $\int_{-1}^1 \left(\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \frac{1}{x} \right) \right) dx$ equal to?

- (a) 0
- (b) $-\frac{\pi}{4}$
- (c) $-\frac{\pi}{2}$
- (d) $\frac{\pi}{2}$

86. In which one of the following intervals is the function $f(x) = x^3 - 3x + 6$ decreasing?

- (a) $(-\infty, 2)$
- (b) $[2, \infty)$
- (c) $(-\infty, \infty)$
- (d) $(2, 3)$

87. The differential equation of the family of curves $y = p \cos (\lambda x) + q \sin (\lambda x)$, where p, q are arbitrary constants, is

- (a) $\frac{d^2y}{dx^2} - \lambda^2 y = 0$
- (b) $\frac{d^2y}{dx^2} - \lambda y = 0$
- (c) $\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda y = 0$
- (d) $\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda^2 y = 0$

88. यदि $(-1, -2)$ को अवधि करने की
 $\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{1}{x^2}$ को संतुष्ट करने का काम करना चाहिए।

- (a) $17x^2y - 8x^2 + 2x^2 - 2 = 0$
 (b) $6x^2y + 17x^2 + 2x^2 - 2 = 0$
 (c) $6xy - 2x^2 + 17x^2 + 2 = 0$
 (d) $17x^2y + 6xy - 2x^2 + 2 = 0$

89. यदि अवधि अधिकारी की फैली करा है, तो उसका रूप $y = a \cos x + b \sin x + cx^{-1} + d$ है, जहाँ $a/b, c$ और d अचूक अंक हैं।

- (a) 1
 (b) 2
 (c) 3
 (d) 4

90. अवधि अधिकारी $\ln\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$ का रूप दर्शाता है।

- (a) $a e^{ax} + b e^{bx} + c$
 (b) $\frac{1}{a} e^{ax} + \frac{1}{b} e^{bx} + c$
 (c) $a e^{ax} + b e^{-bx} + c$
 (d) $\frac{1}{a} e^{ax} + \frac{1}{b} e^{-bx} + c$

उत्तर देखने के लिए जावा की।

91. यदि $u = v^m$ का लिए $v = e^{nx}$ दिया गया है, तो $\frac{du}{dx} + v \frac{dv}{dx}$ दिया गया क्या है ?

- (a) $u e^{2nx}$
 (b) $(x^2 + 1) e^{2nx}$
 (c) $x^2 e^{2nx}$
 (d) $(x + 1) e^{2nx}$

92. यदि $y = \sin(3x)u$ है, तो दिनांकित वे से बीजगणित सम्बन्ध हैं ?

- (a) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$
 (b) $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$
 (c) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0$
 (d) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$

93. एक गेहरा के खाल में बड़ी गूंठों के रूप करने का 40 m लंबाई के एक खाल में जागू लाने की है। यदि अपनी या अधिकारी अपनी अधिकारी द्वारा दिया गया है, तो गेहरा की दिनांकता क्या है ?

- (a) 25 m
 (b) 20 m
 (c) 10 m
 (d) 5 m

88. The equation of the curve passing through the point $(-1, -2)$ which satisfies $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+1}{x^2}$
- $17x^2y + 6x^2 + 3y^2 - 2 = 0$
 - $6x^2y + 17x^2 + 2y^2 - 1 = 0$
 - $6xy - 3x^2 + 17x^2 + 2 = 0$
 - $17x^2y + 6xy - 3y^2 + 5 = 0$
89. What is the order of the differential equation whose solution is $y = a \cos x + b \sin x + c e^{-2x} + d$, where a, b, c and d are arbitrary constants?
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
90. What is the solution of the differential equation $\ln\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$?
- $ay^{ax} + by^{bx} = c$
 - $\frac{1}{a}y^{ax} + \frac{1}{b}y^{bx} = c$
 - $ay^{ax} + by^{-bx} = c$
 - $\frac{1}{a}y^{ax} + \frac{1}{b}y^{-bx} = c$
- where c is an arbitrary constant.
91. If $u = e^{2x} \sin 3x$ and $v = e^{2x} \cos 3x$, then what is $v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx}$ equal to?
- $a. e^{2x}$
 - $(b^2 + b^2)e^{4x}$
 - $ab e^{2x}$
 - $(a+b)e^{2x}$
92. If $y = \sin (bx+ct)$, then which one of the following is correct?
- $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$
 - $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$
 - $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + y = 0$
 - $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$
93. A flower-bed in the form of a sector has been fenced by a wire of 40 m length. If the flower-bed has the greatest possible area, then what is the radius of the sector?
- 25 m
 - 20 m
 - 10 m
 - 5 m

94. $(\sin x - 1)^{\frac{1}{2}}$, जहाँ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, तो अवकलनीय है।

- (a) $\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{2}}$
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{2}}$

95. यदि $y = [\sin x]^{1/b}$ है, तो $x = \frac{\pi}{6}$ के लिए $\frac{dy}{dx}$ का मान क्या है?

- (a) $\frac{2^{-\frac{1}{b}}(b \ln 2 + \sqrt{3}a)}{6}$
- (b) $\frac{2^{\frac{1}{b}}(b \ln 2 + \sqrt{3}a)}{6}$
- (c) $\frac{2^{-\frac{1}{b}}(b \ln 2 + \sqrt{3}a)}{6}$
- (d) $\frac{2^{\frac{1}{b}}(b \ln 2 + \sqrt{3}a)}{6}$

96. $\frac{d}{dx}(1 - \sin 2x)$ का मान क्या है, जहाँ $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ है?

- (a) $\cos x + \sin x$
- (b) $-(\cos x + \sin x)$
- (c) $2(\cos x + \sin x)$
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

97. $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ का मान क्या है?

- (a) $c + \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{a \tan x}{b}\right)$
- (b) $c + \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{b \tan x}{a}\right)$
- (c) $c + \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{b \tan x}{a}\right)$
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर सहित विवरण दें।

98. यदि $f(x) = g(x) + h(x)$ और $g(x) = 1 + \log(x)$ है, तो $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = h(0) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ का मान क्या है?

- (a) $1 + ah'(0)$
- (b) $1 + ab$
- (c) ab
- (d) $ah'(0)$

99. निम्नलिखित $\frac{dx}{dy} = \frac{x+y+1}{x+y-1}$ का ग्रन्थि क्या है?

- (a) $y - x = 4 \ln(x+y) + c$
- (b) $y + x = 2 \ln(x+y) + c$
- (c) $y - x = 3 \ln(x+y) + c$
- (d) $y + x = 3 \ln(x+y) + c$

उत्तर सहित विवरण दें।

94. What is the minimum value of $|x(x-1+1)|^{\frac{1}{2}}$, where $0 \leq x \leq 1$?

- (a) $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $\left(\frac{5}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$

95. If $y = (\sin x)^{\frac{1}{2}}$, then what is the value of $\frac{dy}{dx}$,

$$\text{at } x = -\frac{\pi}{6}$$

- (a) $\frac{2^{-\frac{1}{2}}(6 \ln 2 + \sqrt{3}\pi)}{6}$
- (b) $\frac{2^{\frac{1}{2}} \ln(\ln 2 + \sqrt{3}\pi)}{6}$
- (c) $\frac{2^{-\frac{1}{2}}(6 \ln 2 + \sqrt{3}\pi)}{6}$
- (d) $\frac{2^{\frac{1}{2}} \ln(2 - \sqrt{3}\pi)}{6}$

96. What is $\frac{d\sqrt{1-\sin 2x}}{dx}$ equal to, where

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$$

- (a) $\cos x + \sin x$
- (b) $-(\cos x + \sin x)$
- (c) $2(\cos x + \sin x)$
- (d) None of the above

97. What is $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ equal to?

- (a) $x + \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{a \tan x}{b}\right)$
- (b) $x + \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{b \tan x}{a}\right)$
- (c) $x + \frac{1}{ab} \tan^{-1}\left(\frac{b \tan x}{a}\right)$
- (d) None of the above

where c is the constant of integration.

98. Let $f(x+y) = f(x)f(y)$ and $f(x) = 1 + xy \phi(x)$, where $\lim_{x \rightarrow 0} \phi(x) = a$ and $\lim_{y \rightarrow 0} \phi(y) = b$. Then what is $f'(0)$ equal to?

- (a) $1 + abf(x)$
- (b) $1 + ab$
- (c) ab
- (d) $abf(x)$

99. What is the solution of the differential equation $\frac{dx}{dy} = \frac{x+y+1}{x+y-1}$?

- (a) $y-x+4 \ln(x+y)+c=0$
- (b) $y+x+2 \ln(x+y)=c$
- (c) $y-x+2 \ln(x+y)=c$
- (d) $y+x+2 \ln(x+y)=c$

where c is an arbitrary constant.

100. यदि $\frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{2 \sin^2 x - 2 \sin x - 1}$ सांकेतिक है ?

- (a) $-\frac{3}{2}$
- (b) $-\frac{1}{2}$
- (c) 2
- (d) -3

101. यदि α का चोके कोण β और अभीजनक का कोण γ है, तो योग्यता 10 का अवधारणा की अवधारणा है

- (a) $\frac{1}{10}$
- (b) $\frac{4}{11}$
- (c) $\frac{3}{11}$
- (d) $\frac{2}{11}$

102. 10 लेवलों के एक त्रिमुख नक्शे परिस्थिति महसूस गुणिक 0.8 है। तो ऐसी घटनाकालीन गुण नक्शे का विचारण की अवधारणा है

- (a) 80%
- (b) 77%
- (c) 67%
- (d) 50%

103. अपरिवर्ती और अविवृती के बीच विभिन्न दूरी की अवधारणा होती है। यदि अपरिवर्ती के दूरी की अवधारणा 10 हो तो अविवृती के दूरी की 20 होती है, तो दूरी के अपरिवर्ती और अविवृती की अवधारणा ज्ञात हो

- (a) 20, 50
- (b) 40, 60
- (c) 60, 40
- (d) 80, 20

104. यदि $\sin \alpha = \cos \alpha = \tan \alpha = \cot \alpha = \sec \alpha = \csc \alpha = 0$ है, तो विपरिवर्ती के दूरी का अवधारणा है

1. $\sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \sin(\beta) = \sin(2\alpha)$
2. $\sqrt{2} \sin \theta = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

नीचे दिए गए कूटना प्रयोग कर सही उत्तर चुनें।

- (a) विकल्प I
- (b) विकल्प II
- (c) विकल्प III
- (d) विकल्प IV

105. यदि नीचे दिए A, B और C एक वर्षाकालीन गुण के संबंधित दीर्घ वर्षाकालीन अवधारणा और विकल्पों का उत्तर है। यदि $P(B) = 1.6 P(A)$ और $P(C) = 0.5 P(B)$ है, तो $P(A)$ का उत्तर है

- (a) $\frac{3}{4}$
- (b) $\frac{4}{11}$
- (c) $\frac{9}{11}$
- (d) $\frac{1}{2}$

103. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{3 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}$ equal to?

(a) 7

- (a) $-\frac{1}{2}$
- (b) $-\frac{1}{3}$
- (c) -2
- (d) -3

104. If two dice are thrown and at least one of the dice shows 5, then the probability that the sum is 10 or more is

- (a) $\frac{1}{6}$
- (b) $\frac{4}{11}$
- (c) $\frac{3}{11}$
- (d) $\frac{9}{11}$

105. The correlation coefficient computed from a set of 30 observations is 0.8. Then the percentage of variation not explained by linear regression is

- (a) 64%
- (b) 20%
- (c) 64%
- (d) 16%

106. The average age of a combined group of men and women is 25 years. If the average age of the group of men is 28 years and that of the group of women is 21 years, then the percentage of men and women in the group is respectively

- (a) 20, 80
- (b) 40, 60
- (c) 60, 40
- (d) 80, 20

107. If $\sin \beta$ is the harmonic mean of $\sin \alpha$ and $\cos \alpha$, and $\sin \theta$ is the arithmetic mean of $\sin \alpha$ and $\cos \alpha$, then which of the following is/are correct?

- (a) $\sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\theta}{4}\right) \sin \beta = \sin 2\alpha$
- (b) $\sqrt{2} \sin \theta = \cos\left(\alpha - \frac{\theta}{4}\right)$

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

108. Let A, B and C be three mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. If $P(B) = 1.5 P(A)$ and $P(C) = 0.5 P(B)$, then $P(A)$ is equal to

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{4}{15}$
- (c) $\frac{2}{5}$
- (d) $\frac{1}{3}$

106. एक बोर्ड विकली में, अधिकारी X, Y, Z विकली के कुल उत्पादन के लकड़े: 25%, 20% और 40% बोर्डों का विभाजित करती है। अधिकारी X, Y, Z द्वारा: 25, 45 और 70 टन ऊपरी बोर्डों का विभाजित करती है। उत्पादन में से अनुचित कल से एक बोर्ड विकला जाता है और यह ऊपरी पाना जाता है। इसका प्रतिशत है? जिस उसे अधिकारी X द्वारा बनाया गया है।

(a) $\frac{5}{30}$

(b) $\frac{14}{30}$

(c) $\frac{20}{30}$

(d) $\frac{34}{39}$

107. 6 विकले एक वाहन उत्पादने जाते हैं। उसमें जावा 6 विकले अन्ते वही पाना विभाजित है :

(a) $\frac{7}{64}$

(b) $\frac{37}{64}$

(c) $\frac{87}{256}$

(d) $\frac{225}{256}$

108. अभी के लिए आगे है, फिर 5 वर्षों के बादी और 1 वर्षावारी और 2 वर्षावारी 1 वर्षावारी और 3 वर्षावारी 1 वर्षावारी समूह में से वर्षावारी का एक वर्षों का द्वारा जाता है। यहाँ तक तीन अभी के, 1 वर्षावारी और 2 वर्षावारी के लिए की कला प्रतिशत है।

(a) $\frac{11}{30}$

(b) $\frac{1}{32}$

(c) $\frac{1}{32}$

(d) $\frac{1}{32}$

109. विभिन्न वर्षों का विधान विभाजित :

1. यदि एक सूची की उत्पादक प्रतिशत में 10 वर्षावारी, तो अंतिम में 10 की प्रति तो जाती है।

2. यदि एक सूची की उत्पादक प्रतिशत में 10 वर्षावारी, तो अंतिम विधान में 10 की प्रति तो जाती है।

3. यदि एक सूची की प्रतिशत प्रतिशत की दूरी वह विधान जाए, तो अंतिम दूरी तो जाता है।

उत्पादक में से जोड़े की कला जाती है ?

(a) 1, 2 और 3

(b) 1 और 2

(c) 1 और 3

(d) 2 और 3

106. In a bolt factory, machines X, Y, Z manufacture bolts that are respectively 25%, 35% and 40% of the factory's total output. The machines X, Y, Z respectively produce 2%, 4% and 8% defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that it was manufactured by machine X?

- (a) $\frac{5}{39}$
(b) $\frac{14}{39}$
(c) $\frac{20}{39}$
(d) $\frac{34}{39}$

107. 8 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least 6 heads is

- (a) $\frac{7}{64}$
(b) $\frac{57}{64}$
(c) $\frac{37}{256}$
(d) $\frac{229}{256}$

108. Three groups of children contain 2 girls and 1 boy; 2 girls and 2 boys; 1 girl and 3 boys. One child is selected at random from each group. The probability that the three selected consist of 1 girl and 2 boys is

- (a) $\frac{18}{32}$
(b) $\frac{9}{32}$
(c) $\frac{3}{32}$
(d) $\frac{1}{32}$

109. Consider the following statements:

1. If 10 is added to each entry on a list, then the average increases by 10.
2. If 10 is added to each entry on a list, then the standard deviation increases by 10.
3. If each entry on a list is doubled, then the average doubles.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1, 2 and 3
(b) 1 and 2 only
(c) 1 and 3 only
(d) 2 and 3 only

110. यदि X और Y का समान्तरा θ है। यदि प्रत्येक संभावना में x और y अलग हों, तो यांत्रिकीय संभावना का ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए।

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 8

111. यदि कोई भी X और Y के लिए $x_i > 0, y_i > 0 \forall i = 1, 2, 3, \dots, n$ हो तो उनके गुणों का योग वर्णन करने वाले P और Q हैं, तो $\frac{X}{Y}$ का गुणों का योग है

- (a) $\frac{P}{Q}$
- (b) $\text{antilog} \left(\frac{P}{Q} \right)$
- (c) $n \log P - \log Q$
- (d) $n \log P + \log Q$

112. यदि दो घटनाओं A और B के एक साथ होने की संभिकता p है वही घटना (A और B दोनों में से कम से कम एक घटना) q है, तो संभिकता p में से कम से कम होती है कि

$$1. \quad P(A) + P(B) = 1 - 2p - q$$

$$2. \quad P(A \cap B) = 1 - p - q$$

वीज गणित का ज्ञान कर सकी तथा सुनिश्चित:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) 1 और 2 नहीं

113. यदि X और Y का समान्तरा गुणात् - 6 है, तो X और Y के द्वारा समान्तर गुणों का योग

- (a) $\frac{1}{24}$
- (b) $-\frac{1}{24}$
- (c) $-\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{1}{6}$

114. दिया गया है $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ का एक समुच्चय इस ज्ञान के लिए सभी यह जिन हैं और यह सभी घटनाएँ अवश्य विपरीत एवं विपरीत log वाली हैं। यह x और y के बीच समान्तर गुणात् के संबंधित वर्ष हैं।

- (a) केवल 0 और 1
- (b) केवल 0 और -1
- (c) 0, 1 और -1
- (d) केवल -1 और 1

115. समुच्चय $\{0, 1, 2, \dots, 10\}$ में से दो घटनाएँ x और y, अविवादित घटिया गुणों वाली हैं। $|x - y| > 4$ के दोनों की संभिकता है

- (a) $\frac{10}{11}$
- (b) $\frac{15}{19}$
- (c) $\frac{10}{17}$
- (d) $\frac{23}{121}$

110. The variance of 25 observations is 8. If 2 is added to each observation, then the new variance of the resulting observations is

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 8
- (d) 16

111. If $x_i > 0, y_i > 0$ ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) are the values of two variables X and Y with geometric means P and Q respectively, then the geometric mean of $\frac{X_i}{Y_i}$ is

- (a) $\frac{P}{Q}$
- (b) nothing $\left(\frac{P}{Q}\right)$
- (c) $n(\log P - \log Q)$
- (d) $n(\log P + \log Q)$

112. If the probability of simultaneous occurrence of two events A and B is p and the probability that exactly one of A, B occurs is q, then which of the following is/are correct?

- (1) $P(A) + P(B) = 2 - 2p - q$
- (2) $P(A \cap \bar{B}) = 1 - p - q$

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

113. If the regression coefficient of Y on X is -4 , and the correlation coefficient between X and Y is $-\frac{1}{2}$, then the regression coefficient of X

(on Y) would be

- (a) $-\frac{1}{24}$
- (b) $-\frac{1}{24}$
- (c) $-\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{1}{6}$

114. The set of bivariate observations $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ are such that all the values are distinct and all the observations fall on a straight line with non-zero slope. Then the possible values of the correlation coefficient between x and y are

- (a) 0 and 1 only
- (b) 0 and -1 only
- (c) 0, 1 and -1
- (d) -1 and 1 only

115. Two integers x and y are chosen with replacement from the set {0, 1, 2, ..., 10}. The probability that $|x - y| \geq 5$ is

- (a) $\frac{6}{11}$
- (b) $\frac{35}{121}$
- (c) $\frac{90}{121}$
- (d) $\frac{25}{121}$

116. यह ही बड़ी हो सकती है कि अधिकारी A वर्ष B के अधिकारी को द्वितीय आम नियमिक वेतन का विवरणिक विवरण होता है :

	अधिकारी A	अधिकारी B
प्रतिवर्षीय वीट विवरण	₹ 800	₹ 600
वीक्षण आमिक वेतन	₹ 1500	₹ 1750
वेतनों के घटन वाला प्रभाव	81	100

अधिकारी A वर्ष B के लाभ अधिकारी के एक वार्षिक आम नियमिक वेतन का औसत और वेतनों के घटन का प्रभाव है

- (a) ₹ 1300, 100
- (b) ₹ 1250, 100
- (c) ₹ 1500, 83
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

117. निम्न पदों विवरों के बताए गए 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों के बीच है, या 1, II और III जिहिट है। इन ग्राही को देखता रहा है। यह अधिकारी x, y और z अन्य वासी, वासी II, वासी III का अपना अपना विवरण बताते हैं। यह उपर्युक्त वासी वासी II के अधिकारी का विवरण है यदि $x > y > z$ हो ?

- (a) 14
- (b) 16
- (c) 18
- (d) 20

118. एक जोखाइ वे, विवरणिक वेतन का वार्षिक विवरण दिया जाएगा है :

- (a) वीट
- (b) वीटिका (वीटिका)
- (c) व्यापक वार्षिक विवरण
- (d) व्यापक (व्यापक)

119. विधी भी व्यापक विवरण में (जब वही व्यापक व्यापक वार्षिक विवरण को विवरणिक विवरण है और व्यापक विवरण को विवरणिक वार्षिक विवरण है), वीट व्यापक वेतन के विवरणिक विवरण है और व्यापक विवरण को विवरणिक वार्षिक विवरण है, कि विवरणिक विवरण में व्यापक व्यापक विवरण है ?

- (a) वीट
- (b) $y \leq x$
- (c) $x = y$
- (d) $x < y$

120. विवरणिक विवरण में वीट व्यापक विवरण में, वही व्यापक वार्षिक विवरण व्यापक वार्षिक विवरण में व्यापक विवरण होता है ?

- (a) वीटिकी और वासी की वार्षिक विवरण
- (b) व्यापक वार्षिक विवरण और व्यापक वार्षिक विवरण व्यापक वार्षिक विवरण होते
- (c) व्यापक वार्षिक विवरण और व्यापक वार्षिक विवरण व्यापक वार्षिक विवरण होते
- (d) व्यापक वार्षिक विवरण और व्यापक वार्षिक विवरण व्यापक वार्षिक विवरण होते

118. An analysis of monthly wages paid to the workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following result:

	Firm A	Firm B
Number of workers	500	600
Average monthly wage	₹ 1600	₹ 1750
Variance of distribution of wages	81	100

The average of monthly wage and variance of distribution of wages of all the workers in the firms A and B taken together are:

- (a) ₹ 1650, 100
 - (b) ₹ 1750, 100
 - (c) ₹ 1600, 81
 - (d) None of the above.
117. Three dice having digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on their faces are marked I, II and III and rolled. Let x , y and z represent the number on die-I, die-II and die-III respectively. What is the number of possible outcomes such that $x > y > z$?

- (a) 24
- (b) 36
- (c) 18
- (d) 20

118. Which one of the following can be obtained from this figure?

- (a) Mean
- (b) Median
- (c) Geometric mean
- (d) Mode

119. In any discrete series (when all values are not same), if x represents mean deviation about mean and y represents standard deviation, then which one of the following is correct?

- (a) $y \geq x$
- (b) $y \leq x$
- (c) $x = y$
- (d) $x < y$

120. In which one of the following cases would you expect positive/negative correlation?

- (a) The ages of husbands and wives
- (b) Shoe size and intelligence
- (c) Insurance companies' profits and the number of claims they have to pay
- (d) Amount of rainfall and yield of crop

**काढ़े काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**काचे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

संचये काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK

**काल्पनिक काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

T.B.C. : YPL-S-BLU

Test Booklet Series



TEST BOOKLET MATHEMATICS

Time Allocated : Two Hours and Thirty Minutes

Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES NOT HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITMES, ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. Please note that it is the candidate's responsibility to enclose and fill in the Hall Number and Test Booklet Series Code A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/discrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.
3. You have to enter your Hall Number in the Test Booklet in the Box provided alongside.
DO NOT write anything else on the Test Booklet.
4. This Test Booklet contains 120 items (questions). Each item is printed both in *Hindi* and *English*. Each item comprises four responses (answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you find that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose **ONLY ONE** response for each item.
5. You have to mark all your responses **ONLY** on the separate Answer Sheet provided. See directions in the Answer Sheet.
6. All items carry equal marks.
7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the responses to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.
8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator *only the Answer Sheet*. You are permitted to take away with you the Test Booklet.
9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
10. **Penalty for wrong answers :**
THREE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-third of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be no penalty as above to that question.
- (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

यह बुकेट को खोलने की अनुमति दिया गया है।